



EPI-aktuellt

Vol 2
Nr 49
4 december 2003

Nyhetsbrev från Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Redaktör: [Ragnhild Janzon](#), tfn 08-457 23 64
Ansvarig utgivare: [Johan Giesecke](#), tfn 08-457 23 60
Fax: 08-30 06 26
E-post: epi@smi.ki.se
Prenumeration: Via formulär på [SMI:s hemsida](#)

Innehåll

- MRSA-poliklinik öppnades i Helsingfors
- Tetanus hos intravenösa missbrukare i England
- Tuberkulos i Kampala, Uganda

Hänt i världen

MRSA-poliklinik öppnades i Helsingfors

(Publicerad 2003-11-28 på finska televisionens, YLE, hemsida)

En poliklinik för MRSA-patienter har inlett sin verksamhet i Helsingfors. De fem första patienterna besökte kliniken i torsdags och provtogs. Den tillfälliga polikliniken som finns på Aurora sjukhus kommer att ta emot på förhand utsedda patienter som möjligtvis bär på MRSA-bakterien. Polikliniken grundades som en följd av den MRSA-epidemi som härjat i Helsingfors sedan flera veckor. Hittills har man uppdagat 68 fall. Man försöker hitta dem som eventuellt bär på bakterien. Ifall de tas in för sjukhusvård då de bär på bakterien kan det hända att epidemin sprids igen.

Läs mer om MRSA i Helsingfors på [YLE:s hemsida](#)...

Tetanus hos intravenösa missbrukare i England

Under perioden juli -november 2003 har rapporterats sju fall av kliniskt diagnostiserad tetanus bland missbrukare i västra delarna av England. En av patienterna har avlidit. Symtomen har varierat alltifrån lindrig trismus till uttalade symtom med spasticitet, allvarlig dysfagi, andningssvårigheter, smärtsamma kramper och opistotonus.

Läs mer i [CDR weekly](#)...

Tuberkulos i Kampala, Uganda

En urvalsbaserad studie i Uganda med syfte att inventera tuberkulosförekomsten i ett samhälle visade en årlig incidens av tuberkulos motsvarande 9,2 per 1000 invånare av alla former av tuberkulos och 3,7 per 1000 invånare av direktpositiv smittsam tbc. Knappt hälften av sjukdomsfallen var tidigare kända. Så mycket som 53% av sjukdomsfallen upptäcktes i samband med den aktuella studien.

Författarna konstaterar att tuberkulosförekomsten är extremt hög och att gällande övervakningssystem innebär en underskattning av tuberkulosincidensen. Förbättrade strategier för att hitta personer med tuberkulos är nödvändig för att förhindra smittspridning.

Guwatudde et al. Burden of tuberculosis in Kampala, Uganda. [Bulletin of the World Health Organization 2003, 81 \(11\) sid 799- 805](#)

Länkar till andra smittskyddsnyheter

[CDR Communicable Disease Report \(Storbritannien\)](#)

[EPI-NEWS \(Danmark\)](#)

[EpiNorth](#)

[Eurosurveillance Weekly](#)

[MMWR](#)

[MSIS-rapport \(Norge\)](#)

[ProMed](#)

[WHO Disease Outbreaks News](#)